

NUEVO

# Credelio<sup>TM</sup> PLUS

(lotilaner+milbemicina oxima)

El único endoectocida  
que combina el lotilaner  
extrapurificado de Credelio  
con la milbemicina oxima  
de confianza.



Garrapatas



Pulgas



*D. immitis*



*A. vasorum*



Ascáridos



Anquilostomas



Tricocéfalos

Amplia protección frente a garrapatas, pulgas y nematodos, en un pequeño comprimido masticable mensual y con todo el saber hacer de Elanco.

Elanco

**Credelio™  
PLUS**  
(lotilaner+milbemicina oxima)

# ES LA RAPIDEZ DE CREDELIO

## ACCIÓN INMEDIATA<sup>1</sup>

 **Garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus* y *Dermacentor reticulatus*)** 

- Eliminación de las infestaciones existentes en 8 horas\*
- Inicio de eficacia frente a garrapatas recién adquiridas en 48 horas

 **Pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*)**  

- Eliminación inmediata de las infestaciones existentes en 6 horas
- Eliminación persistente de nuevas infestaciones en 4 horas
- Rompe el ciclo de vida de las pulgas al matarlas antes de que pongan huevos

**1 MES DE  
PROTECCIÓN**



\* *Ixodes ricinus*



PLUS

## LA MILBEMICINA DE CONFIANZA

### PREVIENE ENFERMEDADES MORTALES



#### Dirofilariosis

➤ Prevención de la enfermedad por *Dirofilaria immitis* después de la administración de una sola dosis



#### Angiostrongilosis

➤ Previene la enfermedad causada por *Angiostrongylus vasorum* con una administración mensual

## PROTECCIÓN AMPLIADA FRENTE A GUSANOS INTESTINALES ADULTOS Y JUVENILES


	Eficacia (%)	Contra la etapa adulta	Contra la etapa adulta inmadura	Contra L4
<i>Toxocara canis</i> (ascáride)		>97,2% <sup>2</sup>	≥98,3% <sup>3</sup>	≥96,8% <sup>3</sup>
<i>Ancylostoma caninum</i> (anquilostoma)		>98,1% <sup>2</sup>	≥98,7% <sup>4</sup>	≥97,3% <sup>4</sup>
<i>Trichuris vulpis</i> (tricocéfalo)		≥97,8% <sup>2</sup>		

**Credelio™**  
**PLUS**  
(lotilaner+milbemicina oxima)

# UN PEQUEÑO COMPRIMIDO MENSUAL, DE FÁCIL ADMINISTRACIÓN



- Formulación masticable
- 100% de administración exitosa en perros<sup>2</sup>
- 82% de los perros lo toman de manera voluntaria<sup>2</sup>



# UNA DOBLE DESPARASITACIÓN PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES

- Un solo comprimido para cada rango de peso (hasta 45kg)
- Adecuado para cachorros a partir de 8 semanas<sup>1</sup>
- Adecuado para razas mini a partir de 1,4kg<sup>1</sup>

## Posología:



Peso	1,4 – 2,8 kg	>2,8 – 5,5 kg	>5,5 – 11 kg	>11 – 22 kg	>22 – 45 kg
Dosis del comprimido	56,25/2,11 mg	112,5/4,22 mg	225/8,44 mg	450/16,88 mg	900/33,75 mg
Tamaño del comprimido	 7mm	 9mm	 11,5mm	 14,5mm	 18,5mm


Administrar con comida o después de esta

# EN ELANCO PROPORCIONAMOS SOLUCIONES ANTIPARASITARIAS ORALES PARA PERROS Y GATOS

**Credelio™**  
(lotilaner)



- Para perros y gatos
- Eficacia frente a garrapatas y pulgas<sup>5</sup>
- 1 mes de protección<sup>5</sup>
- Comprimidos masticables<sup>5</sup>



**ACCIÓN RÁPIDA  
EFICACIA MENSUAL**



**INDICADO PARA CACHORROS<sup>5</sup>**  
a partir de 8 semanas de edad,  
1,3 kg en perros y 0,5kg en gatos



**100%  
DE ADMINISTRACIÓN  
EXITOSA EN GATOS<sup>6</sup>**  
>99% EN PERROS<sup>7</sup>



## PERROS



## GATOS



Peso	1,3 a 2,5 kg	>2,5 a 5,5 kg	>5,5 a 11 kg	>11 a 22 kg	>22 a 45 kg	0,5 a 2 kg	>2 a 8 kg
Dosis del comprimido	56 mg	112.5 mg	225 mg	450 mg	900 mg	12 mg	48 mg
Tamaño del comprimido a administrar	7mm	9mm	11,5mm	14,5mm	18,5mm	5mm	7,5mm



# MILBEMAX

- Para perros y gatos
- 15 años de eficacia demostrada
- Acción frente a nematodos y cestodos
- Bien tolerado en hembras gestantes y lactantes<sup>8</sup>



**EFICAZ FRENTE  
A CESTODOS,**  
incluyendo *Echinococcus* spp<sup>8</sup>



**INDICADO PARA CACHORROS<sup>8</sup>**  
Perros: a partir de 2 semanas y/o 0,5- 1kg\*  
Gatos: a partir de 6 semanas y/o 0,5kg



**FORMULACIONES  
PATENTADAS**  
Easychew para perros  
Sabor para gatos



	MILBEMAX CHEWY <sup>8</sup> Comprimidos masticables					MILBEMAX SABOR <sup>8</sup> Comprimidos recubiertos			
	CACHORROS y perros pequeños		PERROS			GATITOS y gatos pequeños		GATOS	
Peso	1 a 5kg	>5 a 10kg	5 a 25kg	>25 a 50kg	>50 a 75kg	0,5 a 1kg	>1 a 2kg	>2 a 4kg	>4 a 8kg
Comprimido									

\*0,5kg con la formulación Milbemax Perro clásico, 1kg con la formulación Milbemax Chewy

La mayoría de gatos pueden tratarse con medio o un comprimido

# Credelio<sup>TM</sup> PLUS

(lotilaner+ milbemicina oxima)

Ofrece a tus pacientes caninos una doble desparasitación con un solo comprimido\* masticable y una única administración mensual.



## Confía en Elanco, experto en antiparasitarios

**expertos**  
EN ANTIPARASITARIOS

**Elanco**

\*hasta 45kg

1. Credelio Plus SPC. 2. Elanco data on file ELAG6150224. 3. Elanco data on file ELA1600364 & ELA1600053. 4. Elanco data on file ELAU5160209 & ELA1600211. 5. Credelio Perros SPC. 6. Cavallen D et al. 2018. 'A randomised, blinded, positive controlled, multicentre pivotal field study to evaluate the efficacy and safety of lotilaner tablets for cats administered orally at a minimum dose rate of 6.0 mg/kg to cats naturally infested with ticks'. Parasites & Vectors. 7. Cavallen D, Murphy M, Seewald W, et al. A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio<sup>TM</sup>) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries. Parasites & Vectors 2017; 10:528. Milbemax SPC.

Credelio Plus 56.25 mg/2.11 mg comprimidos masticables para perros. Credelio Plus 112.5 mg/4.22 mg comprimidos masticables para perros. Credelio Plus 225 mg/8.44 mg comprimidos masticables para perros. Credelio Plus 450 mg/16.88 mg comprimidos masticables para perros. Credelio Plus 900 mg/33.75 mg comprimidos masticables para perros. **Composición:** lotilaner/milbemicina oxima por comprimido: 56.25 mg/2.11 mg, 112.5 mg/4.22 mg, 225 mg/8.44 mg, 450 mg/16.88 mg, 900 mg/33.75 mg. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones de uso:** Garrapatas y pulgas Para el tratamiento de infecciones de garrapatas (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus e I. hexagonus) y pulgas (Ctenocephalides felis C. canis). **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Precauciones:** Todos los datos de seguridad y eficacia se han obtenido de perros cachorros de 8 semanas de edad en adelante y de 14 kg de peso en adelante. El uso de este medicamento veterinario en cachorros de menos de 8 semanas de edad o de menos de 14 kg de peso debe basarse en una evaluación de los beneficios y riesgos realizada por el veterinario responsable. La dosis recomendada debe respetarse estrictamente en perros con mutación MDRI1 (F) asociada a una glucoproteína P-no funcional, que puede incluir los collies o las razas afines. Antes de la primera administración, los perros que se encuentren en zonas endémicas de dirofilariosis deben ser examinados para detectar una infección por Dirofilaria immitis. A discreción del veterinario, los perros infectados deben ser tratados con un antibiótico para matar los dirofilarios adultos. No se recomienda la administración de medicamentos veterinarios que contengan milbemicina oxima (como este medicamento veterinario) a perros con un elevado número de microfilarias circulantes, con el fin de evitar reacciones de hipersensibilidad asociadas a la liberación de proteínas de microfilarias muertas o moribundas. La ingestión accidental puede causar trastornos gastrointestinales. Con el fin de prevenir el acceso a los niños, mantenga los comprimidos o los blísters hasta que sea necesario y mantenga los blísters en el embalaje exterior fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Lévese las manos después de manipular los comprimidos. **Nº de registro:** EU/2/17/206/001-015. **Titular de la autorización de comercialización:** Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Alemania. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Credelio 56 mg comprimidos masticables para perros (1.3-2.5 kg) / Credelio 112 mg comprimidos masticables para perros (2.5-5.5 kg) / Credelio 225 mg comprimidos masticables para perros (5.5-11 kg) / Credelio 450 mg comprimidos masticables para perros (11-22 kg) / Credelio 900 mg comprimidos masticables para perros (22-45 kg) **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Comprimidos masticables Credelio para perros (1.3-2.5 kg): lotilaner (mg); para perros (2.5-5.5 kg): lotilaner (mg); para perros (5.5-11 kg): 112.5 lotilaner (mg); para perros (11-22 kg): 225 lotilaner (mg); para perros (22-45 kg): 450 lotilaner (mg). **Indicaciones de uso:** En el perro, indicado para el tratamiento de infecciones de pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes de eliminación de pulgas (Ctenocephalides felis C. canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus y Dermacentor reticulatus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (Ita allergy dermatitis, IAD). **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Precauciones:** Específicas para su uso en animales: Los datos de eficacia y seguridad de este medicamento veterinario se han obtenido en perros cachorros de 8 semanas de edad o más y de 1.3 kg de peso o más. El uso de este medicamento veterinario en cachorros menores de 8 semanas de edad o de menos de 1.3 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Precauciones específicas:** que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. **Tiempo de espera:** No procede. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Nº de registro: EU/2/17/206/001-015.

Credelio 12 mg comprimidos masticables para gatos (0.5-2.0 kg) / Credelio 48 mg comprimidos masticables para gatos (2.0-8.0 kg). **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: para gatos (0.5-2.0 kg): 12 mg de lotilaner; para gatos (2.0-8.0 kg): 48 mg de lotilaner. **Indicaciones:** Indicado para el tratamiento de infecciones de pulgas y garrapatas en gatos. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes contra las pulgas (Ctenocephalides felis C. canis) y garrapatas (Ixodes ricinus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (Ita allergy dermatitis, IAD). **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Precauciones:** Específicas para su uso en animales: Los datos de eficacia y seguridad de este medicamento veterinario se han obtenido en gatos de 8 semanas de edad o más y con un peso corporal de 0.5 kg o más. Por tanto, el uso de este medicamento veterinario en gatos menores de 8 semanas de edad o de menos de 0.5 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Precauciones específicas:** que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. **Tiempo de espera:** No procede. **NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** EU/2/17/206/016-21. **Fecha de la primera autorización:** 25/04/2017. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

MILBEMAX Comprimidos para perros pequeños y cachorros / MILBEMAX Comprimidos para perros **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Milbemicina oxima 2.5 mg/12.5 mg. **Praziquantel:** 25.0 mg/125 mg. **Indicaciones de uso:** En el perro, tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: Cestodos: Dipylidium caninum, Tenia spp., Echinococcus spp., Mesocistoides spp.; Nematodos: Ankylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichostrongylus axei, Crenosoma vulpis (Reducción del nivel de infección). **Angiostrogylus vasorum** (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos/inmaduros (L5) y adultos; Thelazia callipaeda. El medicamento veterinario se puede también usar en la prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis), si está indicado en el tratamiento concomitante con otros medicamentos. **Contraindicaciones:** No usar en cachorros de menos de 2 semanas de edad y/o que pesen menos de 0.5 kg (perros pequeños y cachorros). No usar en perros que pesen menos de 1 kg (perros). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a alguno de los excipientes. **Advertencias:** Particulares según la especie animal. Los estudios con milbemicina oxima indican que el margen de seguridad en algunos perros de raza Collie o similares es inferior al de otras razas. En estos perros, debe observarse estrictamente la dosis recomendada. La tolerancia de MILBEMAX en los cachorros de estas razas no se ha establecido. Los síntomas clínicos en los Collie son similares a los observados en la población general de perros con sobredosificación. **Precauciones:** Particulares de empleo, incluidas las precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el medicamento a los perros en animales. Para una buena práctica veterinaria, se deberá pesar a los animales para asegurar una dosis exacta. El tratamiento de los perros con un número alto número de microfilarias circulantes puede provocar algunas veces la aparición de reacciones de hipersensibilidad, tales como púrpura de las membranas mucosas, vómitos, temblores, dificultad respiratoria o salivación excesiva. Estas reacciones están asociadas a la liberación de proteínas por parte de las microfilarias muertas o moribundas y no son un efecto tóxico directo del producto. No está por tanto recomendado el uso en perros que sufran microfilariaemia. En áreas de riesgo de Filariosis, o en caso de saber que el perro ha vivido a una zona de tal riesgo, o procede de ella, antes de usar MILBEMAX, se recomienda una visita al veterinario para evaluar la presencia de una infestación concurrente por Dirofilaria immitis. En caso de un diagnóstico positivo, está indicado un tratamiento adicional antes de administrar MILBEMAX. La equinoquinososis representa un riesgo para las personas. En caso de equinoquinososis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a expertos o a institutos de parasitología. No se han hecho estudios en perros gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepáticas o renal seriamente comprometidas. El producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras una valoración beneficio/riesgo por parte del veterinario responsable. En los perros de menos de 4 semanas, es insuficiente una infección por cestodos. Puede por lo tanto que no sea necesario el tratamiento de animales de menos de 4 semanas con un producto combinado. Tras un uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de una clase concreta puede aparecer resistencias contra esa clase específica. **Precauciones específicas:** que deberá tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lévese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. **Tiempo de espera:** No procede. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Nº de registro: MILBEMAX Comprimidos para perros pequeños y cachorros 1502 ESP / MILBEMAX Comprimidos para perros 1503 ESP.

MILBEMAX Comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros / MILBEMAX COMPRESIMIDOS RECUBIERTOS PARA PERROS **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Milbemicina oxima 2.5 mg/12.5 mg. **Praziquantel:** 10 mg/40 mg. **Indicaciones de uso:** En el perro, tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: Cestodos: Dipylidium caninum, Tenia spp., Echinococcus spp., Mesocistoides spp.; Nematodos: Ankylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichostrongylus axei, Crenosoma vulpis (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos/inmaduros (L5) y adultos; Thelazia callipaeda. El medicamento veterinario se puede también usar en la prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis), si está indicado en el tratamiento simultáneo con otros medicamentos. **Contraindicaciones:** No usar en perros que pesen menos de 1 kg (MILBEMAX comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros). No usar en perros que pesen menos de 5 kg (MILBEMAX COMPRESIMIDOS RECUBIERTOS PARA PERROS). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Precauciones:** Específicas para su uso en animales: Los estudios con milbemicina oxima indican que el margen de seguridad en algunos perros de raza Collie o relacionadas es inferior al de otras razas. En estos perros, debe administrarse estrictamente la dosis recomendada. La tolerancia del medicamento veterinario en los cachorros de estas razas no se ha establecido. Los síntomas clínicos en los Collie son similares a los observados en la población general de perros con sobredosificación. **Precauciones:** Particulares de empleo, incluidas las precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el medicamento a los perros en animales. Para una buena práctica veterinaria, se deberá pesar a los animales para asegurar una dosis exacta. El tratamiento de los perros con un número alto número de microfilarias circulantes puede provocar algunas veces la aparición de reacciones de hipersensibilidad, tales como púrpura de las membranas mucosas, vómitos, temblores, dificultad respiratoria o salivación excesiva. Estas reacciones están asociadas a la liberación de proteínas por parte de las microfilarias muertas o moribundas y no son un efecto tóxico directo del medicamento. No está por tanto recomendado el uso en perros que sufran microfilariaemia. En áreas de riesgo de dirofilariosis, o en caso de saber que el perro ha vivido a una zona de tal riesgo, o procede de ella, antes de usar MILBEMAX, se recomienda una visita al veterinario para evaluar la presencia de una infestación concurrente por Dirofilaria immitis. En caso de un diagnóstico positivo, está indicado un tratamiento adicional antes de administrar MILBEMAX. La equinoquinososis representa un riesgo para las personas. En caso de equinoquinososis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a expertos o a institutos de parasitología. No se han hecho estudios en perros gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepáticas o renal seriamente comprometidas. El producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras una valoración beneficio/riesgo por parte del veterinario responsable. En los perros de menos de 4 semanas, es insuficiente una infección por cestodos. Puede por lo tanto que no sea necesario el tratamiento de animales de menos de 4 semanas con un producto combinado. Tras un uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de una clase concreta puede aparecer resistencias contra esa clase específica. **Precauciones específicas:** que deberá tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lévese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. La equinoquinososis representa un riesgo para las personas. En caso de equinoquinososis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a expertos o a institutos de parasitología. **Tiempo de espera:** No procede. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Nº de registro: 2114 ESP/2113 ESP.

MILBEMAX COMPRESIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS / MILBEMAX COMPRESIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS TALLEROS Y GATITOS) No usar en gatos que pesen menos de 2 kg (MILBEMAX COMPRESIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS). **Precauciones:** Específicas para su uso en animales: Para una buena práctica clínica, los animales se deben pesar para asegurar una dosificación exacta. La equinoquinososis es un riesgo para las personas. En caso de equinoquinososis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o a institutos de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepáticas o renal seriamente comprometidas. Este producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras una correspondiente valoración del riesgo / beneficio por parte del veterinario responsable. **Precauciones específicas:** que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lévese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. **Tiempo de espera:** No procede. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Nº de registro: 1504 ESP/1505 ESP.

Credelio PLUS, Credelio, MILBEMAX, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. PM-ES-21-0145